

医療福祉専門学校 緑生館
専攻看護学科

平成31年度
第2期入学試験問題

看護全般 実施時間：70分

試験時間：9時15分 ～ 10時25分

受験番号

氏名

注意：解答はマークシートの番号をマークしてください。

問題用紙は試験終了後に回収いたしますので持ち出さないようにしてください。

問 1. 日本の人口静態・動態について正しいものを選びなさい。

- a. 平成 28 年の世帯構造をみると、単独世帯は約 40%に増加している。
- b. 将来推計人口は、今後年々増加傾向となる。
- c. 平成 27 年の主要死因は悪性新生物、肺炎、心疾患の順となっている。
- d. 平成 28 年の死亡数は約 130 万人である。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 2. 社会保障給付費で最も割合が高いものを選びなさい。

- a. 年金
- b. 医療
- c. 福祉
- d. 介護

1. a 2. b 3. c 4. d

問 3. 人間の特性について正しいものを選びなさい。

- a. マズローの基本的欲求では、集団に帰属し他者との有意義な関係を作ることが自己実現の欲求と考えられている。
- b. エリクソンの人間の発達課題の考え方では老年期の発達課題を「親密性対孤立」としている。
- c. 人間はホメオスタシスと適応規制によって環境に適応している。
- d. 人間の性は身体的・情緒的・社会的側面から捉えられ、生物的な性をジェンダーとよぶ。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 4. 看護と法について正しいものを選びなさい。

- a. 准看護師は厚生労働大臣の免許を受ける。
- b. 准看護師が実施した看護業務に過失があった場合、その責任を負う。
- c. 准看護師が業務上知りえた情報・秘密を守ることは刑法に規定されている。
- d. 保健師助産師看護師法において准看護師には名称独占の規定はない。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 5. 看護活動について正しいものを選びなさい。

- a. 看護要約は入院時に面接や観察・測定などによって収集した患者の基礎情報である。
- b. 患者の生活の単位となっている1つのまとまりを看護単位という。
- c. 看護歴とは看護ケアの方向と内容を示すものである。
- d. 看護師の教育活動は看護師自身のペースで段階的に行う。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 6. 介護保険法について正しいものを選びなさい。

- a. 介護保険法では在宅療養者のケアプランは看護師が作成する。
- b. ヘルパーによる在宅療養者の吸引は法的に認められていない。
- c. 介護保険法では40歳以上の者が被保険者であり、65歳以上は第1号被保険者である。
- d. デイサービスやデイケアは施設サービスに含まれる。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 7. コミュニケーションについて正しいものを選びなさい。

- a. 「今日の様子はいかがですか？」は閉ざされた質問である。
- b. 部屋の雰囲気や椅子の位置なども影響を受ける。
- c. 会話を多くするほど信頼関係は深まる。
- d. 必要な情報は状況を問わず、すべて伝える必要がある。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 8. 動脈血酸素分圧が最も高い血液が流れている血管を選びなさい。

- a. 肺動脈
- b. 肺静脈
- c. 大動脈
- d. 大静脈


1. a 2. b 3. c 4. d

問 9. 酸素吸入療法について正しいものを選びなさい。

- a. 酸素マスクでは5～8 L/分・40～60%程度の吸入が可能である。
- b. 経鼻カニューレでは口からゆっくり吸気を促すと効果的である。
- c. 喫煙する場合、酸素は中止せず外で吸ってもらう。
- d. 呼吸苦が出現している場合には酸素流量を増やす。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 10. 真空採血管を用いた採血の手順の一部を示す。「駆血帯を外す時点」に該当する矢印を選びなさい。



1. a 2. b 3. c 4. d

問 11. 点滴静脈内注射について正しいものを選びなさい。

- a. 刺入部の疼痛の訴えがあった場合、すぐに滴下速度を遅くする。
- b. 注射法のなかで血中濃度の上昇が最も速い。
- c. 同一体位で可能な限り動かないように説明する。
- d. 点滴筒には薬液を1/2～1/3程度満たす。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 1 2. 出血性ショックの症状について正しいものを選びなさい。

- a. 顔面紅潮
- b. 意識混濁
- c. 高度徐脈
- d. 尿量増加

1. a 2. b 3. c 4. d

問 1 3. 移動の援助について正しいものを選びなさい。

- a. ベッドからストレッチャーへの移乗時はストレッチャーの高さをベッドよりも少し高くしておくといよい。
- b. 酸素吸入や点滴静脈注射などの治療は安全を考慮して移動中は一旦中止し、目的地に到着後再開する。
- c. ベッドから車椅子への移乗の際、安定した座位を保てない場合は車椅子に移乗してから履き物を履かせてもよい。
- d. 車椅子でエレベーター利用時は、できるだけエレベーターの中で方向転換をする。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 1 4. 寝衣交換の援助について正しいものを選びなさい。

- a. 丸首のパジャマの場合は両上肢から着衣し頭部は最後に着衣する。
- b. 濡れた寝衣は熱伝導が低く保温力が大きくなるため速やかに交換する。
- c. 寝衣を選ぶ際は患者の希望は考慮せず治療に適した形やデザインを選ぶ。
- d. 麻痺がある場合は健側から脱がせ患側から着せる。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 1 5. 睡眠を促す援助について正しいものを選びなさい。

- a. 体位に制限がなければ患者が安楽だと感じる体位をとらせる。
- b. 睡眠を妨げる不安や心配事の訴えは夜間は聞かないようにする。
- c. 睡眠薬の使用後は睡眠を妨げないようにできるだけ訪室しない。
- d. 夜間の睡眠不足には、できるだけ昼間に睡眠をとらせ不足を補う。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 16. 口腔の清潔の援助について誤っているものを選びなさい。

- a. 口腔内の細菌繁殖を防ぐほか歯肉の血液循環を良好にし歯周病を予防する目的がある。
- b. 歯間ブラシやデンタルフロスは歯肉を傷つける危険性があるため使用しないようにする。
- c. 義歯は就寝時に取り外し、洗浄後水入りの容器に入れて保管する。
- d. 含嗽時は膿盆を下顎や頬の形状に合わせ、すき間ができないようにあてる。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 17. 食事の援助について正しいものを選びなさい。

- a. 片麻痺の場合は小まくらやタオルなどで患側を上にして食塊が健側を通過するよう体位を調整する。
- b. 気管切開をしている場合は誤飲・誤嚥の危険性が高いため経口摂取はできないことを説明する。
- c. 第1相の嚥下困難のある患者の場合さらさらした水や食塊を形成しない食品を選ぶ。
- d. 拒食患者の経口摂取量が少ない場合すぐに絶食にし、高エネルギー輸液を開始する。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 18. 排泄の援助について誤っているものを選びなさい。

- a. 摘便をする場合は直腸を傷つけないようにワセリンやオリーブ油などの潤滑油を使用する。
- b. 大部屋でポータブルトイレを使用中の患者からナースコールがあった場合、インターホンを通して排便の確認をしてから訪室する。
- c. 下痢時は腸蠕動運動を亢進させないよう消化の良い食事にし水分摂取を促す。
- d. 自然排尿を促す場合は流水音を聞かせたり下腹部に温罨法をする方法がある。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 19. 次のうち誤っているものを選びなさい。

- a. 平成28年10月1日現在の日本の人口ピラミッドは57～59歳頃と40～45歳頃に2つの膨らみを持つツボ型となっている。
- b. 平成28年国民生活基礎調査によると夫婦と未婚の子のみの世帯が最も多い。
- c. 平成28年肺の悪性新生物の年齢調整死亡率は微減傾向となっている。
- d. 平成24年国民健康・栄養調査では糖尿病が強く疑われる者、糖尿病の可能性が否定できない者合わせて減少している。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 20. 肺がんについて正しいものを選びなさい。

- a. 小細胞がんは最も悪性度が高い組織型で肺がんの40%を占める。
- b. 腺がんは症状があらわれにくく、喫煙との関係が深い。
- c. 大細胞がんは比較的中枢の気管支に発生することが多い。
- d. 扁平上皮がんは男性に多く早期に咳や血痰などの症状が出現する。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 21. 血液疾患患者の看護について誤っているものを選びなさい。

- a. 出血傾向のある患者では衣類・駆血帯による圧迫に注意する。
- b. 血漿タンパクのアルブミンは栄養の輸送や浸透圧の維持の役割を果たす。
- c. 白血球数が2000/ μl 以下になると重篤な感染症が発症しやすくなる。
- d. 血小板が4万/ μl 以下になると出血傾向が生じる。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 22. 膠原病について正しいものを選びなさい。

- a. 膠原病とは臓器特異的疾患である。
- b. 全身性エリテマトーデス (SLE) は60歳代女性に多い。
- c. 皮膚筋炎・多発性筋炎は眼瞼にヘリオトロープ疹がみられる。
- d. 関節リウマチは男性に多く発症する。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 23. 次のうち正しいものを選びなさい。

- a. Tリンパ球は液性免疫である。
- b. 麻疹ウイルスは空気感染する。
- c. ノロウイルスは胃炎を引き起こす。
- d. ツベルクリン反応陽性者にはBCGワクチン接種がすすめられる。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 24. 人工呼吸器装着患者について正しいものを2つ選びなさい。

- a. 人工呼吸器装着中の患者は点滴で栄養管理しているので栄養状態の観察は必要ない。
- b. 人工呼吸器装着時の合併症として心拍出量の低下、腎機能の低下、肺の器質的変化がある。
- c. 人工呼吸器は気道を空気が通るので加温・加湿は必要ない。
- d. 気管内チューブを同一部位で長く固定しておくとう瘍ができることがあるので毎日固定し直す必要がある。
- e. 気道吸引は低酸素血症予防のため1回の吸引時間を25～30秒以内とする。

1. a 2. b 3. c 4. d 5. e

問 25. 耳鼻咽喉疾患について誤っているものを選びなさい。

- a. 突発性難聴は感音性難聴である。
- b. 眼振の検査は体温と異なる温度の水を外耳道に注入して刺激する温度眼振がある。
- c. 両側反回神経麻痺は呼吸困難を生じる。
- d. 鼻腔深部をキーゼルバッハ部位とよび、ここから鼻出血する場合が多い。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 26. 内分泌障害について正しいものを選びなさい。

- a. 高尿酸血症の痛風発作は足の拇趾に好発する。
- b. 褐色細胞腫では低血圧を引き起こす。
- c. 慢性甲状腺炎では甲状腺機能亢進症状を呈する。
- d. アジソン病では中心性肥満がみられる。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 27. 慢性頭蓋内圧亢進症の特徴的な症状でないものを選びなさい。

- a. 頭痛
- b. 吐き気
- c. チアノーゼ
- d. うつ血乳頭

1. a 2. b 3. c 4. d

問 28. フォルクマン拘縮がおきた場合について正しいものを選びなさい。

- a. 2～3時間で不可逆性となる。
- b. 患肢は心臓の位置より下に降ろす。
- c. 肘の屈曲は90度以上になるように調整する。
- d. ギブスカットを行い、再度強く圧迫・再固定する。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 29. 更年期の不定愁訴として誤っているものを選びなさい。

- a. 眩暈
- b. 無力感
- c. 不眠
- d. 幻覚

1. a 2. b 3. c 4. d

問 30. 脂質異常症を合併する疾患について正しいものを選びなさい。

- a. ネフローゼ症候群
- b. 腎盂腎炎
- c. 急性糸球体腎炎
- d. IgA 腎症
- e. 腎硬化症

1. a 2. b 3. c 4. d e. 5

問 31. 加齢に伴う変化について正しいものを選びなさい。

- a. 皮膚感覚の閾値の低下
- b. 肺胞表面積の増大
- c. 胃・腸粘膜の肥厚
- d. 収縮期血圧の上昇

1. a 2. b 3. c 4. d

問 32. 高齢者を取りまく社会環境について正しいものを選びなさい。

- a. 平成 28 年簡易生命表によると日本人の平均寿命は男性 81 歳、女性 84 歳である。
- b. 後期高齢者に対する医療は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて提供されている。
- c. 外来受療率は 90 歳以上と 75 歳～84 歳を比較すると 90 歳以上のほうが高い。
- d. 日本の将来推計人口によると、2055 年（平成 67 年）には高齢化率が 60%とピークを迎えるとされている。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 33. 検査・治療に伴う高齢者の看護について正しいものを選びなさい。

- a. 内服時は食道・胃粘膜付着を避けるため、水分は少なめにして服用してもらう。
- b. 高齢者は薬物が蓄積しにくいいため、薬効が変化しやすい。
- c. 検査を受ける場合、思考の混乱を避けるため事前オリエンテーションを控える。
- d. 不安を伴う検査や理解力が低下した高齢者が検査を受ける場合、患者を一人にしない。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 34. 加齢に伴う知能の変化として正しいものを選びなさい。

- a. 判断力・言語能力は 20 歳代前半より著しく衰える。
- b. 新しい記憶は保持しやすく古い記憶は忘れやすい。
- c. 結晶性知能は加齢の影響を受けにくい。
- d. 流動性知能は年齢とともに上昇する。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 35. 廃用症候群について正しいものを選びなさい。

- a. 局所症状として関節拘縮・筋弛緩・尿路結石・褥瘡・静脈血栓症などがある。
- b. 安静を余儀なくされた場合、股関節の内旋や屈曲、足関節の尖足が発生しやすい。
- c. 心肺機能の低下により 1 回の心拍出量の低下や心拍数の減少がおこる。
- d. 長期臥床により循環血流量の調整機能が低下し、起立時に血圧が上昇する。
- e. 身体的活動低下だけでなく、認知機能の低下や情緒が不安定になる。

1. a 2. b 3. c 4. d 5. e

問 36. 予防接種について正しいものを選びなさい。

- a. ヘモフィルス・インフルエンザb型菌 (Hib) ワクチンは法に基づく定期予防接種である。
- b. 麻疹・風疹(MR)混合ワクチンは不活化ワクチンである。
- c. BCG ワクチンの接種対象者は、生後1歳以上である。
- d. B型肝炎ワクチン (HB ワクチン) は任意の予防接種である。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 37. 小児の身体計測について正しいものを選びなさい。

- a. 身長を立位で計測するのは1歳以上である。
- b. 胸囲は安静時の吸気終了時の値を計測する。
- c. 乳児の体重は授乳・排泄・入浴などにより変動するため、計測時刻や条件を一定にする。
- d. 腹囲測定は仰臥位にして膝を曲げ、臍部の周径を計測する。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 38. 小児の遊びの発達と社会性について正しいものを選びなさい。

- a. 感覚運動遊びは幼児期を中心にみられる。
- b. 象徴遊びは物を何かにみたとしたり、ある役割になりきる遊びである。
- c. 構成遊びは創造的な遊びで乳児期を中心にみられる。
- d. 並行遊びとは他の子どもとやり取りしながら話しかけ交渉がさかんである。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 39. 子どもの歯の発育について正しいものを選びなさい。

- a. 乳歯は生後6～8か月ごろからはえはじめる。
- b. 2～3歳で上下15本ずつ計30本がはえそろう。
- c. 10歳ごろから乳歯が抜け始める。
- d. 乳幼児期の健康や栄養状態は永久歯の萌出に影響しない。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 40. ファロー四徴症の症状について誤っているものを選びなさい。

- a. 肺動脈狭窄
- b. 大動脈騎乗
- c. 左室肥大
- d. チアノーゼ

1. a 2. b 3. c 4. d

問 41. 新生児の原始反射について誤っているものを選びなさい。

- a. 吸啜反射は口腔内に入ったものを吸啜することである。
- b. 把握反射は開いている新生児の手掌を押すと強く握ることである。
- c. バビンスキー反射は児の頭と上体を起こして急に降ろすと最初に四肢を伸展し、次に抱きつくような動作をすることである。
- d. 緊張性頸反射は頭を一方に向けると同側の上肢を伸展し、反射側は屈曲させ、フェンシングの様な格好をすることである。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 42. 妊娠による母体の変化として誤っているものを選びなさい。

- a. 下痢になりやすい。
- b. 循環血液量は増加する。
- c. 頻尿になる。
- d. 基礎代謝は亢進する。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 43. 胎児付属物について誤っているものを選びなさい。

- a. 胎児付属物とは胎盤・臍帯・卵膜・羊水をいう。
- b. 卵膜は内側より脱落膜・絨毛膜・羊膜の3層で構成されている。
- c. 臍帯には1本の臍静脈と2本の臍動脈がある。
- d. 羊水は無色透明の液体で弱アルカリ性である。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 44. 妊娠期の異常について誤っているものを選びなさい。

- a. 切迫早産とは早産に至る危険性が高い状態をいう。
- b. 妊娠高血圧症候群は分娩後はもとの状態に戻ることが多い。
- c. 受精卵が子宮内膜以外の場所に着床した場合を異所性妊娠という。
- d. 児の生存が望めない23週未満で妊娠が終了することを流産という。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 45. 免疫グロブリンについて誤っているものはどれか。

- a. 免疫グロブリンには、IgA・IgG・IgM・IgD・IgEの5つがある。
- b. IgEは胎盤を通過する。
- c. IgAは母乳に多く含まれるため母乳栄養の利点のひとつに挙げられる。
- d. IgMは胎児感染があると増加する。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 46. プロセスレコードを作成する目的で正しいものを選びなさい。

- a. 看護場面における患者の妄想や幻覚に対する対処方法を検討する。
- b. 事故につながる可能性のある看護場面を分析する。
- c. 看護場面において意思疎通が困難な患者のコミュニケーションについて検討する。
- d. 看護場面における看護師自身の感情や言動・行動の傾向をつかむ。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 47. 5年間の入院期間がある50歳の統合失調症患者。退院が1か月後に決まった。両親は自宅で健在である。患者より「自宅に帰ると服薬を忘れて、なにもしないで寝てばかりの生活になりそうで心配です」と相談を受けた。この患者に最も適切な社会資源を選びなさい。

- a. デイケア
- b. 訪問看護
- c. グループホーム
- d. 福祉工場

1. a 2. b 3. c 4. d

問 48. 幻覚・妄想状態の看護について正しいものを選びなさい。

- a. 症状の内容を否定されると自分の存在そのものを否定されたと感じ、拒否的・攻撃的になることがある。
- b. 幻覚や妄想による苦痛に対して共感すると患者は内容をより確信するため、訴えに共感的な態度で接してはならない。
- c. 信頼関係を構築するために、訴えを事細かく聞き出す。
- d. 訴えが続くときはしっかりと説得することが必要である。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 49. 不安について正しいものを選びなさい。

- a. 不安とは、はっきりとした対象のある不快な感覚である。
- b. 病的な不安が最も高まった状態をパニックという。
- c. パニック発作は副交感神経が異常に興奮した状態である。
- d. パニック発作は数時間の経過を経て徐々に改善する。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 50. 精神科医療における行動制限について正しいものを選びなさい。

- a. 12 時間を超える隔離の場合は精神保健指定医の指示が必要である。
- b. ほかの患者への他害行為がありそうな場合、看護師の判断で緊急的に隔離・拘束を行い、事後承諾を受ける。
- c. 保護室が満床の場合、一時的もしくは緊急避難的に保護室へ複数人隔離することができる。
- d. 6 時間を超えない身体拘束は、精神保健指定医以外の医師の判断で可能である。

1. a 2. b 3. c 4. d